

Untersuchungen über den Gehalt des Blutplasmas an Gesamteiweiss, Fibrinogen und Reststickstoff bei Schwangeren.

Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen Leukocytenzerfall und Entstehung fibrinbildender Substanzen und deren Bedeutung für die Schwangerschaftsnieren und Eklampsie.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde in der Medizin und Chirurgie,

mit Genehmigung der hohen Medizinischen Fakultät

der

Vereinigten Friedrichs-Universität

Halle-Wittenberg

vorgelegt von

Erich Landsberg

aus Berlin.



Halle a. S.

Hofbuchdruckerei von C. A. Kaemmerer & Co.

1912.

Gedruckt mit Genehmigung
der medizinischen Fakultät der Universität Halle-Wittenberg.

Referent: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. J. Veit.

v. Hippel
z. Z. Dekan.

Dem Andenken meiner lieben Eltern!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Das Verhalten des Blutes in der Gravidität, und insbesondere die Beziehungen zwischen mütterlichem und fötalem Blute sind im letzten Jahrzehnt Gegenstand lebhaften Interesses geworden. Allerdings sind schon in früherer Zeit Blutuntersuchungen bei Schwangeren und Neugeborenen ausgeführt worden, aber abgesehen von dem Umstande, dass die verwendeten Methoden den neuzeitlichen Ansprüchen vielfach nicht zu entsprechen vermögen, beging man bei den Untersuchungen des Nabelschnurblutes den Fehler, die gefundenen Resultate zu vergleichen mit den für den Erwachsenen festgestellten Zahlen.

Soweit ich aus der Literatur ersehen kann, war J. Veit (1) der Erste, welcher in einer grösseren Versuchsreihe das fötale Blut direct mit dem möglichst gleichzeitig entnommenen mütterlichen Blute verglichen hat, eine Forderung, an der man trotz der oft nicht unbeträchtlichen Schwierigkeit der Ausführung unbedingt festhalten muss. Seiner Arbeit über den osmotischen Druck zwischen Mutter und Kind, in welcher er als Erster die Kryoskopie, die Lehre von der Gefrierpunktserniedrigung, der Erforschung der Stoffwechselvorgänge zwischen Mutter und Kind dienstbar machte, folgten bald eine grosse Anzahl anderer Autoren, welche das Blut von Schwangeren und Neugeborenen in morphologischer, biologischer, physikalischer und chemischer Hinsicht studirten.

Es würde zu weit führen, wollte ich all' der Forscher Erwähnung thun, welche auf diesem Gebiete gearbeitet haben. Wer sich über die einschlägige Literatur informiren will, findet eine sehr vollständige Zusammenstellung im Referat von Heymann (2).

Hat es also an Bemühungen nicht gefehlt, die einzelnen Fragen der Blutbeschaffenheit zu klären, so ist dieses Ziel doch nur zum Theil erreicht worden, indem die einzelnen Ergebnisse vielfach von einander abweichen. Ganz besonders gilt dies auch von den Eiweissbestimmungen, eine Thatsache, die wohl am besten aus einer Anführung der in den hauptsächlichsten Arbeiten gefundenen Mittelwerthe sich erkennen lässt.

Frühere Untersuchungen über das Gesamteiweiss.

Zangemeister (3): Schwangere 63,2 pM., Kreissende 66,8 pM., gesunde, nicht schwangere Frauen 81,5 pM., angegebenes Literaturmittel 84,5 pM.

Zangemeister und Meissl (4): Mutter 67,9 pM., Kind 51,6 pM.

Lewinski (5): Schwangere 76,7 pM., gesunde Nichtschwangere 72,9 pM.

Scipiades und Farkas (6): Schwangere 75,0 pM., Kreissende 76,0 pM., Wöchnerinnen 73,5 pM.

Raineri (7) findet im Blute von Schwangeren die Eiweissmenge verringert und giebt an, dass im Fötalblut der Gehalt an Proteinen grösser sei als im mütterlichen Blute.

Bauereisen (8) nennt für den Eiweissgehalt des Nabelschnurblutes 55,0 pM., für denjenigen des Blutes aus dem retroplacentaren Hämatom 81,5 pM. als Durchschnittszahl, wobei jedoch gesagt werden muss, dass dieser Autor den gefundenen Stickstoffgehalt mit 6,37! multiplicirt.

Wie man sieht, handelt es sich hier nicht um kleine Zahlendifferenzen, welche durch individuelle Schwankungen oder durch kleine Unterschiede in der Versuchsausführung sich erklären liessen, sondern um directe Widersprüche in der Beantwortung der grundlegendsten Fragen.

Zangemeister, Meissl und Raineri finden das Bluteiweiss in der Schwangerschaft geringer, Lewinski, Scipiades und Farkas im Gegensatz dazu grösser als bei der normalen Frau. Im Fötalblut stellen Zangenmeister, Meissl und Bauereisen eine Verminderung, Raineri hingegen eine Vermehrung der Eiweissmenge im Vergleich zum mütterlichen Blute fest.

Eine genaue Nachprüfung dieser Ergebnisse an einer möglichst grossen Zahl von Fällen schien also sehr erwünscht.

In neuester Zeit begnügt man sich aber nicht mehr mit der Feststellung der gesammten Eiweissmenge, sondern man ist auch bemüht, die einzelnen Eiweisskörper quantitativ von einander zu scheiden und ihr Verhältniss bei den einzelnen pathologischen Zuständen zu erforschen.

Mit Recht weisen Langstein und Meyer (9) darauf hin, dass in dieser Hinsicht nur die Untersuchung des Blutplasmas nutzbringend sein kann. Gerade der specifische Eiweisskörper des Blutplasmas, das Fibrinogen, aus welchem bekanntlich bei der Gerinnung das Fibrin sich bildet, scheint bei einzelnen Erkrankungen ein constantes Verhalten zu zeigen. Es kann nur mit Freude begrüsst werden, dass auch die Geburtshelfer und Gynäkologen ihr Interesse diesen für die normale wie pathologische Physiologie gleichwichtigen Fragen zugewendet haben.

Frühere Fibrinogenbestimmungen.

Die bisher im normalen menschlichen Blutplasma vorgenommenen Fibrinogenbestimmungen sind nur spärlich. Ich habe in der Literatur folgende Zahlenangaben gefunden:

Pfeiffer (10):	0,3490 pCt.	} Männer
	0,4251 "	
	0,3661 "	
Erben (11):	0,3235 "	
Lewinski (5):	Männer	Frauen
	0,36 pCt.	0,27 pCt.
	0,48 "	0,35 "

Hieraus ergeben sich folgende Mittelwerthe des Fibrinogengehaltes:

Männer 0,384 pCt., Frauen 0,31 pCt.

Auf Veranlassung von Dienst, auf dessen Arbeiten ich später eingehen werde, hat Lewinski das Fibrinogen bei normalen Schwangeren und Eklamtischen bestimmt.

Frühere Untersuchungen hatten nämlich gezeigt, dass der Fibringehalt bei Schwangeren und besonders bei Eklamtischen grösser ist als in der Norm. Die diesbezüglichen Literaturangaben sind:

Nasse (12): Fibrin bei Nichtschwangeren i. M.	2,36 pM.
„ im 6.—8. Schwangerschaftsmonat	3,354 „
„ im 9. Schwangerschaftsmonat	3,673 „
„ während des Kreissens	3,82 „

Kollmann (13): Fibrin bei Eklamtischen	9,0 pM.	} i. M. 7,7 pM.
	7,5 „	
	6,7 „	

Dienst (14): Fibrin bei Schwangerschaftseklampsie	2,8 pM.
„ „ Eklampsie während der Geburt	3,87 „
„ „ Wochenbettseklampsie	4,665 „

Ich möchte nicht unterlassen, auf den beträchtlichen Unterschied hinzuweisen, welcher zwischen den Untersuchungsergebnissen von Kollmann und Dienst besteht. Die von dem erstgenannten Autor angegebenen Zahlen müssen wegen ihrer ausserordentlichen Höhe recht fraglich erscheinen. Nach Dienst zeichnet sich nur die Wochenbettseklampsie durch einen erheblich gesteigerten Fibrin-gehalt aus.

Bei dem Vergleich der Zahlen für das Fibrin und das Fibrinogen muss man sich stets die Thatsache vor Augen halten, dass ganz allgemein weniger Fibrin entsteht, als dem vorhandenen Fibrinogen entspricht.

Lewinski (5) findet die folgenden Mittelzahlen für das Fibrinogen:

2 nicht schwangere Frauen	0,31 pCt. (s. o.)
4 normale Schwangere	0,45 „
3 Eklamtische	0,53 „
1 Eklamtische	0,32 „ !
1 Urämische	0,26 „

Der Forscher sagt von seinen Untersuchungen bei den Eklamtischen selbst Folgendes:

„Das Fibrinogen zeigt in diesen 3 Fällen eine weitere, aber sehr geringe Zunahme gegenüber der Schwangerschaft.“ Im vierten Falle war sogar eine deutliche Abnahme des Fibrinogens zu constatiren. Lewinski giebt auch selbst zu, dass seine Untersuchungen nicht im Stande sind, die Fibrinogenfrage zu entscheiden, indem die Zahl von 2 Nichtschwangeren und 4 Schwangeren nicht ausreichend ist, um sichere Schlüsse daraus ziehen zu können. Als besonders beachtenswerthes Moment kommt noch hinzu, dass Lewinski bei den Eklamtischen die Blutentnahme „auf der Höhe

der Erscheinungen“, d. h. also während oder kurz nach der Geburtsarbeit vorgenommen hat, wohingegen er dies bei normalen Schwangeren nicht gethan. Von vornherein musste es für sehr wahrscheinlich gelten, dass bereits bei Kreissenden sich höhere Fibrinogenerthe als bei Schwangeren im 8. und 9. Monat finden würden, zumal dies für das Fibrin bereits von Nasse festgestellt worden ist.

Ich habe mich bemüht, durch zahlreiche Untersuchungen die hier vorhandenen Lücken auszufüllen.

Methoden zur Fibrinogendarstellung.

Die erste Vorbedingung zur quantitativen Fibrogenbestimmung ist das Verhindern der Blutgerinnung. Dieses lässt sich auf verschiedenen Wegen erreichen.

Noch heute erfreut sich in dieser Hinsicht die von Arthus und Pagès (15) angegebene Verwendung von kalkfällenden Mitteln einer grossen Beliebtheit, ein Verfahren, welches auf der Thatsache beruht, dass die Anwesenheit von Kalksalzen eine nothwendige Bedingung für das Zustandekommen der Gerinnung ist. Arthus und Pagès empfahlen, das Blut aufzufangen in einer Lösung von Kaliumoxalat oder Fluornatrium und zwar so, dass der Gehalt des Blutes an Kaliumoxalat 0,1 pCt., an Fluornatrium 0,3 pCt. beträgt.

Diese Zahlen haben späterhin eine geringe Abänderung erfahren, indem Hammersten (16) 0,25—0,3 pCt. Kialumoxalat, Reye (17) 0,56—0,6 pCt. Fluornatrium als optimalen Salzgehalt empfehlen.

Die Darstellung des Fibrinogens aus dem Blutplasma ist mit recht erheblichen Schwierigkeiten verknüpft. Zur Klasse der Globuline gehörig theilt es mit diesen die chemischen Eigenthümlichkeiten und kann nur durch Anwendung einer ganz bestimmten Concentration der Fällungsmittel von diesen gesondert erhalten werden.

Bereits Denis (18), welcher als Erster eine Isolirung des Fibrinogens versuchte, benutzte zu diesem Zwecke das Kochsalz. Indessen fallen bei der von ihm verwendeten Ganzsättigung auch andere Globulineiweisskörper des Blutes aus, und erst Hammersten hat die folgende brauchbare Methode angegeben:

Das durch Kaliumoxalat ungerinnbar gemachte Blut wird kräftig centrifugirt. Das abgeheberte klare Plasma bleibt ca. 24 Stunden bei einer Temperatur von ca. 0 Grad stehen, und es scheidet sich dann meist ein geringfügiger Niederschlag ab, welcher entfernt wird.

Die Flüssigkeit wird nun mit $\frac{1}{2}$ Vol. gesättigter kalkfreier Kochsalzlösung versetzt und der entstehende, sehr geringfügige Niederschlag abfiltrirt. Dem Filtrat wird dann $1\frac{1}{2}$ —2 Vol. ges. Kochsalzlösung zugesetzt, der entstehende Niederschlag in 8proc. Kochsalzlösung gelöst, durch Zusatz von 1 Vol. ges. Kochsalzlösung das Fibrinogen wiederum gefällt und dies dreimal wiederholt. Der zuletzt entstehende Niederschlag wird in Wasser gelöst, die Lösung durch Diffusion gegen 0,003 proc. Natronlauge salzfrei gemacht und schliesslich das Fibrinogen durch Alkohol abgeschieden, bis zur Gewichtsconstanz getrocknet und gewogen.

Durch Heubner (19) und Huiscamp (2) hat diese Methode einige Ergänzungen erfahren, die ich an dieser Stelle aber nicht näher schildern zu sollen glaube.

Ein zweites, neueres Verfahren zur Fibrinogenbestimmung stammt von Reye (17).

Bereits Kander (21) zeigte, dass man durch fractionirte Fällung mit Ammoniumsulfat eine gute quantitative Trennung der Globuline von den Albuminen erzielen kann. Reye führt den Nachweis, dass dieses Salz auch zur Fibrinogenfällung äusserst geeignet ist, indem seine Untersuchungen ergaben, dass Fibrinogen bei 2,5—2,8 cem (obere Grenze) gesättigter Ammoniumsulfatlösung pro 10 cem Flüssigkeit bei 2 cem Plasma, Serum-Globulin hingegen erst bei 2,9 cem (untere Grenze) ausfällt. Er empfiehlt folgendermaassen vorzugehen:

Zu 12 cem Fluornatriumplasma (0,56—0,6 pCt. Salzgehalt) fügt man 30 cem Aqua dest. und 16 cem ges. Ammoniumsulfatlösung. Der schnell sich absetzende Niederschlag wird nach ca. 4 Stunden auf einem aschefreien Filter gesammelt und mit entsprechend verdünnter Ammoniumsulfatlösung (42 Teile Aqu. dest. und 16 Teile ges. Lösung), so lange gewaschen, bis sich das Filtrat als völlig eiweissfrei erweist. Alsdann lässt man den Niederschlag lufttrocken werden, coagulirt ihn ca. 12 Stunden bei 85 Grad, wäscht ihn mit heissem Wasser, Alkohol und Aether sehr gründlich aus, trocknet und wägt ihn.

Beide Methoden können nicht als völlig genau gelten. Durch Halbsättigung mit Kochsalz erhält man zwar einen sehr reinen, aber, besonders bei Verarbeitung kleinerer Blutmengen, quantitativ zu geringen Fibrinogenniederschlag, während andererseits bei dem Verfahren von Reye, welches im Allgemeinen zur vergleichenden

quantitativen Bestimmung geeigneter zu sein scheint, die Reinheit des Niederschlages von manchen Seiten angezweifelt wird (22).

Was die technische Ausführung anbelangt, so ist an und für sich die Reye'sche Methode weniger zeitraubend als die von Hammersten. Letztere kann man aber dadurch sehr vereinfachen, dass man das Fibrinogen aus seiner Lösung durch die Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl (23) berechnet, ein Verfahren, welches bei sorgfältiger Ausführung durchaus brauchbare Resultate liefert. Bei der Fällung mit Ammoniumsulfat lässt sich die Wägung nicht umgehen, weil es sich hier um ein stickstoffhaltiges Salz handelt.

Lewinski (5) hat bei seinen Untersuchungen die Methode von Hammersten in sehr vereinfachter Form angewendet. Er versetzt 10—15 cem Oxalatplasma mit 15—25 cem ges. Kochsalzlösung, sammelt den Niederschlag nach einigen Stunden auf einem asche-freien Filter, wäscht ihn mit einer Kochsalzlösung von 15 Theilen ges. Lösung mit 25 Theilen Wasser aus bis das Filtrat völlig eiweissfrei, und bestimmt seinen Stickstoffgehalt nach Kjeldahl.

Anfangs hatte ich gegen dieses Verfahren, welches durch seine grosse Einfachheit imponiren muss, mancherlei Bedenken. Lewinski setzt $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ Vol. ges. Kochsalzlösung hinzu und spricht den ganzen entstehenden Niederschlag als Fibrinogen an, während von Hammersten zur endgültigen Abscheidung dieses Eiweisskörpers nur 1 Vol. ges. Lösung benutzt wird. Nun sagt dieser Autor aber selbst von dem Zusatz von $1\frac{1}{2}$ —2 Vol. ges. Salzlösung zu 1 Vol. Oxalatplasma, dass dieses „ohne Gefahr für eine Verunreinigung mit Paraglobulin geschehen kann.“ Das Paraglobulin steht bekanntlich dem Fibrinogen am nächsten und eine Verunreinigung mit diesem Eiweisskörper ist daher am ehesten zu befürchten. Bedenkt man fernerhin, dass, wie bereits oben erwähnt, bei der Ausführung der Hammersten'schen Methode ein Quantitätsverlust sich kaum vermeiden lässt, so wird man das Vorgehen von Lewinski für durchaus haltbar erachten müssen.

Trotzdem würde ich der Ammoniumsulfatfällung den Vorzug gegeben haben, wenn ich nicht die von mir mit den von Lewinski gefundenen Werthen direct hätte vergleichen wollen. Hierzu war eine möglichst weitgehende Uebereinstimmung in der Versuchsausführung ein unbedingtes Erforderniss,

Eigene Versuche.

Meine Untersuchungen erstrecken sich auf 18 Schwangere vom 6. bis 10. Monat mit drei Wiederholungen; 10 Kreissende, 6 Neugeborene, 8 nichtschwangere in Bezug auf die Blutbeschaffenheit normale Frauen. Ein Fall von Oedem und Albuminurie in der Gravidität.

Ausserordentlich bedauere ich, dass es mir nicht möglich war, mehr pathologische Fälle, namentlich auch Eklampsiekranke zu untersuchen, wie ich es beabsichtigt hatte. Unter diesen Umständen ist es mir besonders angenehm, dass ich in der Methodik fast genau mit Lewinski übereinstimme.

Versuchsausführung.

50 bis 60 ccm Blut, der Vena mediana bezw. der schnell unterbundenen Nabelschnur entnommen, wurden in einem Kolben von ca. 65 ccm aufgefangen, der vorher mit 3 ccm einer 5 proc. Kaliumoxalat-lösung beschickt worden war. Hierzu möchte ich bemerken, dass ich in den von mir angestellten Vorversuchen einen Vorzug der Fluornatriumlösung vor der Kaliumoxalatlösung, wie er von Reye angegeben wird, nie habe constatiren können. Das so ungerinnbar gemachte Blut wurde nun sofort zunächst eine halbe Stunde und dann nochmals drei Viertelstunden kräftig centrifugirt. Hierdurch liess sich am besten jeder Uebertritt von Stoffen aus den Formelementen in die Blutflüssigkeit, insbesondere auch jegliche Hämolyse vermeiden, was sonst wenigstens beim kindlichen Blute häufig nicht der Fall ist. Das klare Plasma wurde 12—24 Stunden bei Eiskühlung aufbewahrt und alsdann filtrirt. Auf diese Weise habe ich durchschnittlich von der Mutter 35 ccm, vom Kinde 25 ccm eines völlig klaren, sehr haltbaren Oxalatplasmas gewonnen.

In diesem bestimmte ich das Fibrinogen; das Gesamteiweiss; den Gesamtstickstoff.

Fibrinogenbestimmung.

10 ccm Plasma wurde in einer Porcellanschale mit 15 ccm chemisch reiner, gesättigter Kochsalzlösung versetzt, der entstehende Niederschlag nach ca. 6 Stunden auf einem aschefreien Filter gesammelt und mit halbgesättigter Kochsalzlösung bis zur völligen Eiweissfreiheit des Filtrates gewaschen.

Gesamteiweissbestimmung (23b).

In einer geräumigen Porcellanschale wurde 2—3 ccm Plasma in ca. 50—75 ccm kochende Aq. dest. eingetragen und der kochenden Flüssigkeit ganz vorsichtig unter ständigem Umrühren tropfenweise 2 proc. Essigsäure zugesetzt so lange bis das Eiweiss in grösseren Flocken ausfiel und die darüber befindliche Flüssigkeit völlig klar erschien. Das Filtrat darf keine Spur von Eiweissreaktion geben.

Dieses Verfahren verlangt zur genauen Ausführung einiger Uebung. Hat man sich dieselbe angeeignet, so kann man mit ihm sehr genaue Resultate erzielen.

Sowohl das Filter mit dem Fibrinogen wie das mit dem Gesamteiweiss wurde verascht und der Stickstoff nach Kjeldahl bestimmt. Die Veraschung des Fibrinogenniederschlages muss anfangs sehr vor-

sichtig über kleiner Flamme geschehen, weil es in Folge des beträchtlichen Salzgehaltes leicht zum Ueberspritzen kommt.

Aus der Stickstoffmenge erhält man das Gesamteiweiss durch Multiplication mit 6,25, das Fibrinogen durch Multiplication mit 100/16,66 = 6, indem der Stickstoffgehalt des Fibrinogens 16,66 pCt. beträgt.

In 2—3 cem Plasma wurde schliesslich noch der Gesamtstickstoff bestimmt und durch Subtraction des Eiweissstickstoffs vom Gesamtstickstoff der Reststickstoff erhalten. Bei der Mutter wurde jeder Versuch doppelt ausgeführt, während beim Kinde wegen des geringeren Materials dieses meist nur für die Fibrinogenbestimmung möglich war.

Versuchsergebnisse.
Tabelle I. Schwangere.

Numer	Name	Wieviele Gravidität?	Zeit der Gravidität	Eiweiss-N in 100 cem Oxalat- plasma g	Ge- sammt- Eiweiss in pCt. g	Fibrinogen- N in 100 cem Oxalat- plasma g	Fibri- nogen in pCt. g	Gesamt- stickstoff in 100 cem Oxalat- plasma g	Rest- stickstoff in 100 cem Oxalat- plasma g
1	N.	II.	X. Monat.	0,966	6,04	0,08	0,48	1,001	0,035
2	E.	I.	X. Monat.	1,130	7,06	0,07	0,42	1,152	0,022
3	M.	I.	X. Monat.	1,060	6,63	0,09	0,54	1,099	0,039
4	W.	I.	X. Monat.	1,085	6,78	0,087	0,52	1,110	0,025
5	H.	III.	VIII. Monat.	0,994	6,21	0,065	0,39	1,105	0,021
6 a)	L.	I.	VIII. Monat.	0,959	6,00	0,056	0,33	0,979	0,020
6 b)	L.	I.	X. Monat.	1,012	6,32	0,077	0,46	1,040	0,028
7	D.	I.	VIII. Monat.	1,015	6,34	0,078	0,47	1,039	0,024
8	J.	I.	IX. Monat.	1,029	6,43	0,088	0,53	1,049	0,020
9	L.	II.	VIII. Monat.	1,050	6,56	0,061	0,37	1,069	0,019
10	K.	I.	IX. Monat.	1,022	6,39	0,077	0,46	1,044	0,022
11 a)	B.	I.	VI. Monat.	1,060	6,63	0,051	0,306	1,085	0,025
11 b)	B.	I.	VIII. Monat.	1,072	6,70	0,064	0,38	1,091	0,019
12	B.	I.	X. Monat.	1,085	6,78	0,083	0,50	1,108	0,023
13 a)	O.	II.	VII. Monat.	1,120	7,00	0,074	0,44	1,151	0,031
13 b)	O.	II.	IX. Monat.	1,106	6,90	0,070	0,42	1,135	0,029
14	W.	II.	IX. Monat.	1,085	6,78	0,063	0,38	1,110	0,025
15	H.	I.	X. Monat.	0,994	6,21	0,077	0,46	1,017	0,023
16	Sch.	I.	VII. Moment.	1,036	6,48	0,056	0,336	1,056	0,020
17	H.	I.	VIII. Monat.	0,980	6,13	0,067	0,40	0,999	0,019
18	B.	I.	IX. Monat.	1,130	7,06	0,058	0,35	1,153	0,023

In 100 cem Oxalatplasma sind demnach enthalten bei Schwangeren im VI. bis X. Monat.

im Max.: Fibrinogen 0,54 g, Gesamteiweiss 7,06 g
Reststickstoff: 0,039 g
im Min.: Fibrinogen 0,306 g, Gesamteiweiss 6,00 g
Reststickstoff: 0,019 g
im Mittel: Fibrinogen 0,426 g, Gesamteiweiss 6,54 g
Reststickstoff: 0,024 g

In 100 cem Oxalatplasma beträgt der Fibrinogengehalt:
bei Schwangeren im VI. u. VII. Monat:
im Max. 0,44 g, im Min. 0,306 g
im Mittel 0,36 g;
bei Schwangeren im VIII. bis X. Monat:
im Max. 0,54 g, im Min. 0,33 g
im Mittel: 0,437 g

Tabelle II. Kreissende.

Nummer	Name	Wievielte Geburt?	Zeit der Blutentnahme	Eiweiss-N in 100 cem Oxalat-plasma g	Gesamt-Eiweiss in pCt. g	Fibrinogen-N in 100 cem Oxalat-plasma g	Fibrinogen in pCt. g	Gesamtstickstoff in 100 cem Oxalat-plasma g	Reststickstoff in 100 cem Oxalat-plasma g
1	W.	II.	$\frac{3}{4}$ Std. antepart.*	1,134	7,09	0,076	0,46	1,166	0,032
2	St.	II.	$\frac{1}{2}$ Std. post part.	1,029	6,43	0,089	0,54	1,050	0,021
3	L.	I.	$\frac{1}{2}$ Std. post part.	1,015	6,34	0,088	0,53	1,039	0,024
4	H.	I.	$\frac{1}{4}$ Std. post part.	0,959	6,00	0,086	0,52	0,980	0,021
5	St.	I.	4 Std. ante part.	1,043	6,52	0,089	0,53	1,070	0,027
6	B.	I.	gleichzeit. m. part.	1,085	6,78	0,094	0,56	1,105	0,020
7	K.	II.	gleichzeit. m. part.	1,008	6,30	0,076	0,46	1,022	0,016
8	M.	I.	$\frac{1}{2}$ Std. post part.	1,064	6,65	0,085	0,51	1,085	0,021
9	H.	I.	1 Std. ante part.	1,155	7,20	0,080	0,48	1,177	0,022
10	P.	I.	$\frac{1}{2}$ Std. ante part.	1,019	6,37	0,070	0,42	1,049	0,030

* Anm.: Partus bedeutet hier das Durchtreten des Kopfes.

Tabelle III. Neugeborene.

Nummer	Name	Eiweiss-N in 100 cem Oxalatplasma g	Fibrinogen-N in 100 cem Oxalatplasma g	Gesamt-N in 100 cem Oxalatplasma g	Gesamt-eiweiss in pCt.-g	Fibrinogen in pCt.-g	Reststickstoff in 100 cem Oxalatplasma g
1	W.	0,770	0,031	0,789	4,81	0,186	0,019
2	L.	0,763	0,038	—	4,79	0,23	—
3	B.	0,770	0,037	0,795	4,81	0,22	0,025
4	K.	0,810	0,043	—	5,06	0,26	—
5	M.	0,861	0,035	0,876	5,38	0,21	0,015
6	P.	0,875	0,050	—	5,46	0,30	—

In 100 cem Oxalatplasma sind demnach enthalten bei Kreissenden:

im Max.: Fibrinogen 0,56 g, Gesamteiweiss 7,20 g
 Reststickstoff 0,032 g
 im Min.: Fibrinogen 0,42 g, Gesamteiweiss 6,00 g
 Reststickstoff 0,016 g
 im Mittel: Fibrinogen 0,50 g, Gesamteiweiss 6,57 g
 Reststickstoff 0,0234 g.

In 100 cem Oxalatplasma sind demnach enthalten bei Neugeborenen:

im Max.: Fibrinogen 0,30 g, Gesamteiweiss 5,46 g
 Reststickstoff 0,024 g
 im Min.: Fibrinogen 0,19 g, Gesamteiweiss 4,79 g
 Reststickstoff 0,015 g
 im Mittel: Fibrinogen 0,24 g, Gesamteiweiss 5,05 g
 Reststickstoff 0,020 g.

Tabelle IV. Nichtschwangere Frauen.

Nummer	Name	Krankheit	Eiweiss-N in 100 cem Oxa- latplasma	Gesamteiweiss in pCt.-g	Fibrinogen-N in 100 cem Oxalatplasma	Fibrinogen in pCt.-g	Gesamt- stickstoff in 100 cem Oxa- plasma	Reststickstoff in 100 cem Oxalatplasma
1	M.	Retroflexio: keine Blutungen	1,141	7,13	0,056	0,33	1,155	0,014
2	Z.	Descensus vag.: do.	1,160	7,25	0,067	0,40	1,181	0,021
3	H.	Retroflex. mob.: do.	1,085	6,78	0,057	0,34	1,110	0,025
4	J.	do. do.	1,106	6,91	0,060	0,36	1,125	0,019
5	D.	do. do.	1,092	6,83	0,0714	0,43	1,120	0,020
6	K.	Retroflexio: do.	1,113	6,96	0,067	0,40	1,135	0,022
7	H.	Prolapsus vag.	1,120	7,00	0,0742	0,445	1,144	0,024
8	E.	Hysterie	1,155	7,22	0,513	0,31	1,175	0,020

In 100 cem Oxalatplasma sind demnach enthalten bei nichtschwangeren Frauen, deren Blutzusammensetzung als normal angesehen werden kann:

im Max.: Fibrinogen 0,445 g, Gesamteiweiss 7,22 g
Reststickstoff 0,025 g
im Min.: Fibrinogen 0,31 g, Gesamteiweiss 6,78 g
Reststickstoff 0,014 g
im Mittel: Fibrinogen 0,377 g, Gesamteiweiss 7,01 g
Reststickstoff 0,021 g.

V. Ein Fall von Oedemen und Albuminurie in der Schwangerschaft.

Es handelte sich hier um eine Schwangere, deren Urin 1,5 pM. Eiweiss enthielt. Im Sediment waren zahlreiche Cylinder nachweisbar. Starke Oedeme.

Die Blutentnahme geschah 10 Tage vor der Entbindung. Es ergaben sich folgende Werthe:

Fibrinogen: . . . 0,448 g
Gesamteiweiss . . . 5,656 g
Gesamttstickstoff . . 5,932 g
Restickstoff . . . 0,276 g.

Eine vergleichende Betrachtung zeigt, dass meine Ergebnisse gut übereinstimmen einerseits mit den von Zangemeister und Meissl (3 und 4) für das Gesamteiweiss und den Reststickstoff, andererseits von Lewinski (5) für das Fibrinogen gefundenen Werthen.

Nach meinen Untersuchungen ist der Gesamteiweissgehalt im Mittel bei Schwangeren bzw. Kreissenden geringer als bei Nichtschwangeren: 6,54:6,57:7,01. Bei Neugeborenen geringer als bei der Mutter: 5,03:6,57.

Fibrinogengehalt im Mittel bei Schwangeren etwas grösser als bei Nichtschwangeren: 0,426, (6.—10. Monat): 0,437, (8.—10. Monat): 0,377. Bei Kreissenden noch höher als bei Schwangeren: 0,507:0,437. Bei Neugeborenen in 0 pCt. auf die Gesamteiweissmenge berechnet, nicht nur geringer als bei Kreissenden, sondern auch niedriger als bei den Nichtschwangeren: 4,7 pCt., 7,6 pCt., 5,36 pCt. Der Reststickstoff zeigt keine bemerkenswerthen Verschiebungen.

In dem einen pathologischen Fall ist einerseits die geringe Ge-

sammteiweissmenge — 5,65 pCt. — andererseits der sehr hohe Reststickstoffgehalt — 0,276 pCt. — bemerkenswerth. Leider hat es Lewinski unterlassen bei den Eklamptischen den Reststickstoff zu bestimmen. Mit grösster Wahrscheinlichkeit lässt sich auch bei diesen eine starke Steigerung vermuthen. Der Fibrinogengehalt — 0,448 pCt. — ist keineswegs gegenüber den Werthen der normalen Schwangerschaft erhöht.

Neben der letzten Thatsache möchte ich besonders den Punkt hervorheben, dass schon bei normalen Kreissenden der Fibrinogengehalt gegenüber der Schwangerschaft ziemlich beträchtlich gesteigert ist.

Wie schon gesagt, findet Lewinski bei Eklamptischen im Mittel 0,53 pCt. Fibrinogen. Im Vergleich mit der für die letzten Schwangerschaftsmonate festgestellten Mittelzahl — 0,45 pCt. — glaubt er eine „sehr geringe Zunahme“ nicht ausschliessen zu können. In Wirklichkeit liegen aber die Verhältnisse anders. Stellt man, wie es zur richtigen Beurtheilung der Frage erforderlich ist, die Werthe der normalen Kreissenden und der Eklamptischen gegenüber, so sieht man, dass von einer Fibrinogensteigerung bei letzteren nicht die Rede sein kann.

Noch besser als an den Durchschnittszahlen lässt sich dieses an den Einzelresultaten zeigen. Bei der Mehrzahl der Kreissenden, ja selbst bei 2 Schwangeren finden sich Werthe über 0,5 pCt. — im Maximum 0,56 pCt. bzw. 0,54 pCt. — obwohl es sich um durchaus normale Fälle handelt.

Diese Feststellungen erscheinen mir gerade jetzt interessant.

Seitdem besonders durch die Untersuchungen von Schmorl (24) und Lubarsch (25) festgestellt worden ist, dass für das pathologische Bild der Eklampsie eine ausgedehnte Thrombose charakteristisch ist, wird von einigen Seiten die Ansicht vertreten, dass für diese Erkrankung das ätiologische Moment mehr oder weniger in einem starken Anwachsen gerinnungsbildender Substanzen zu suchen sei.

Dienst (26) hat nun in einer kürzlich erschienenen Arbeit auf Grund seiner nach der Arneth'schen Methode ausgeführten Untersuchungen über das Verhalten der weissen Blutkörperchen bei der Schwangerschaftsnier- und Eklampsie eine neue eigenartige Theorie aufgestellt, die ich im Folgenden kurz zusammenfassen möchte.

Bei den genannten pathologischen Zuständen stellt Dienst eine Hyperleukocytose fest, welche sich nicht nur in quantitativer,

sondern, was er für die Hauptsache hält, auch in qualitativer Hinsicht von dem Leukocytenbilde bei der normalen Schwangerschaft unterscheidet. Während nämlich im letzteren Falle die Zahl der ein- und zweikernigen polynucleären Leukocyten diejenige der vielkernigen bedeutend übertrifft, findet sich bei der Schwangerschaftsnier- und besonders bei der Eklampsie das umgekehrte Verhältniss, d. h. also ein starkes Prävaliren der vielkernigen polynucleären Leukocyten.

Von der Annahme ausgehend, dass es gerade diese Blutkörperchen sind, welche bei ihrem Zerfall diejenigen Substanzen liefern, die das Fibrin entstehen lassen, d. h. also einerseits das Fibrinogen, andererseits das Fibrinferment, in Sonderheit Thrombokinese, glaubt er, dass durch einen starken Zerfall dieser so zahlreich vorhandenen Leukocyten die fibrinbildenden Substanzen in reichlicher Menge entstehen und ihre schädigende Wirkung auf den mütterlichen Organismus ausüben.

Bei der Schwangerschaftsnier- geht dieser Vorgang nur allmählich vor sich, und die entstehende Thrombokinese kann durch die im Blutplasma normaler Weise vorhandenen gerinnungshemmenden Körper unschädlich gemacht werden. Nicht so das Fibrinogen. Angeblich soll das Fibrinogen die Fähigkeit besitzen, das Endothel der Capillaren zu schädigen und so zur Entstehung von Oedemen und, falls auch die glomerulären Capillaren der Nieren ergriffen werden, zur Albuminurie Veranlassung geben können.

Bei der Eklampsie hingegen kommt es zu einer ganz plötzlichen Ueberschwemmung der oberen Körperhälfte mit den fibrinerzeugenden Substanzen, und es bilden sich zahlreiche Thrombosen, namentlich auch in den Hirngefässen, welche die eklamptischen Anfälle hervorrufen.

Zur Begründung dieser Anschauung zieht Dienst den Umstand heran, dass es sich bei Eklamptischen meistens um Erstgebärende oder um eine mehrfache Schwangerschaft handelt, d. h. also um Frauen, bei denen in Folge straffer Bauchdecken oder abnormer Füllung des Uterus eine sehr starke Blutstauung in den unteren Extremitäten eintritt. Gerade hier sollen sich nun die vielkernigen polynucleären Leukocyten ansammeln und bald in Folge der schlechten Circulationsverhältnisse degeneriren. Beim Eintritt der Wehen gelangen diese degenerirten Leukocyten in grosser Zahl in den allgemeinen Kreislauf, und die freiwerdenden beträchtlichen

Mengen von Fibrinogen und Thrombokinase können zahlreiche Thrombosen hervorrufen.

Dienst spricht schliesslich die Vermuthung aus, dass alle Frauen, die an Schwangerschaftsnier- oder Eklampsie erkranken, auch schon vor diesen Zuständen eine Hyperleukocytose quantitativ nicht aber qualitativer Natur gehabt haben.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die angeführte Theorie nur durch wenig Thatsächliches gestützt ist. Wenn Dienst sagt, Lewinski hat gefunden, dass bei Eklampischen der Fibrinogengehalt „gegenüber der Norm um ein Bedeutendes vermehrt ist“, so entspricht dies nicht den Thatsachen. Nach meinen Untersuchungen lässt sich, wie schon hervorgehoben, sowohl für die Eklampsie wie auch mit Wahrscheinlichkeit für die Schwangerschaftsnier- ein Anwachsen des Fibrinogens ausschliessen. Auch wird man gewisse Bedenken gegen so weitgehende Schlussfolgerungen aus der Leukocytdifferenzirung nach Arneth kaum unterdrücken können, denn dieser Punkt kann heute noch keineswegs als völlig geklärt gelten.

Vor Allem erscheint es wichtig, die Frage eingehend zu untersuchen, in wie weit nach den geltenden physiologischen Anschauungen Leukocytenzerfall und Fibrinvermehrung zusammenhängen.

Hierzu muss ich ausführlicher auf den Process der Blutgerinnung eingehen.

Seit den Untersuchungen von Alex Schmidt (28) und Hammersten (29) ist es eine feststehende Thatsache, dass das Fibrin durch eine fermentative Umwandlung des Fibrinogens entsteht. Ueber den Charakter des Fibrinfermentes ist eine völlige Einigung trotz der sehr zahlreichen Arbeiten noch nicht erzielt worden.

Die im Folgenden ausgeführten, sich an die Anschauungen von Morawitz (30), Feld und Spiro (31) anschliessenden Hauptpunkte der Gerinnungslehre geniessen jetzt die weitgehendste Anerkennung und sie liegen auch den Ausführungen von Dienst zu Grunde.

Das Fibrin entsteht durch Einwirkung des activen Fibrinfermentes, d. h. Thrombin, auf das Fibrinogen. Das Thrombin bildet sich aus dem im Blutplasma präexistirenden Thrombogen und der nicht präformirten Thrombokinase unter dem Einfluss von Kalksalzen. Bei dem Gerinnungsvorgang wird nicht alles gebildete Thrombin verbraucht, vielmehr ist es auch im Serum vorhanden,

allerdings zum überwiegenden Theil in einer unwirksamen Form, Metathrombin; dieses Metathrombin kann durch Zusatz von Alkalien und Säuren activirt werden.

An dieser Stelle interessirt vor Allem die Herkunft des Fibrinogens und der Thrombokinase.

Herkunft des Fibrinogens.

Ursprünglich glaubte man, dass das Fibrinogen erst extravasculär beim Zerfalle der geformten Blutelemente entstehe.

Diese Anschauung ist bereits durch Joh. Müller (32) widerlegt worden, welcher bewies, dass „der Faserstoff in flüssiger Form“ sich im Blute vorfindet.

Die verschiedensten Organe sind seither mit der Fibrinogen- resp. Fibrinbildung in Zusammenhang gebracht worden, so von Lehmann, Brown-Séguard, Cl. Bernard u. A. m. die Haut und besonders der Darm, von Dastre (33) die Lunge, welche nach diesem Forscher auch gleichzeitig fibrinzerstörend wirken soll.

A. Schmidt (28) behauptete, dass aus dem in den Zellen vorhandenen Cytoglobin zunächst das Paraglobin und dann das Fibrinogen entsteht. Diese ganz unbewiesene Hypothese hat kaum einen Anhänger gefunden, und es ist unzweifelhaft, dass das Fibrinogen direct aus zelligen Elementen hervorgeht.

Die Anschauung, dass der Darm die Ursprungsstätte des Fibrinogens sei, hat, obwohl lediglich auf der unsicheren Behauptung beruhend, dass das Mesenterialvenenblut reicher an diesem Eiweisskörper sei als das arterielle Blut, eine allgemeine Annahme gefunden.

In neuerer Zeit ist diese Ansicht besonders von Mathew (34) verfochten worden, welcher die Einwirkung der Herausnahme des Darmes bei der Katze studirte. Er kam zu dem Resultat, dass nach gänzlicher Defibrination eine Neubildung des Fibrinogens nicht stattfindet, wenn der Darm vorher entfernt worden ist. Unter Betonung des nach seiner Meinung stets vorhandenen Parallelismus zwischen Leukocytenzahl und Fibrinmenge stellt er die Behauptung auf, dass durch den Zerfall der Leukocyten namentlich des Darmes das Fibrinogen entsteht.

Auch Corin und Ansiaux, welche die Beobachtung machten, dass nach Phosphorvergiftung das Blut ungerinnbar wird, sprechen die Läsionen des Darmes als die Ursache für das Ausbleiben der

Gerinnung an. In der Leber sehen sie den Zerstörungsort des Fibrinogens.

Diese Meinung stammt bereits von Lehmann (36), welcher angiebt, dass das Lebervenenblut kein Fibrin enthalte und nicht coagulire.

Es muss auffällig erscheinen, dass, obwohl diese Versuche zu einer Zeit ausgeführt worden sind, wo die Fibrinogenbestimmung noch gänzlich unvollkommen war, fast alle Physiologen bis in die neueste Zeit, zum grössten Theil ohne jegliche Controlle, sich dieser Ansicht angeschlossen haben.

Auch Dienst (26), welcher sich der Mathew'schen Anschauung von der Fibrinogenbestimmung anschliesst, sieht in der Leber ein für den Abbau dieses Eiweisskörpers höchwichtiges Organ und sagt, dass gerade in Folge der Leberschädigung bei der Eklampsie ein *Circulus vitiosus* schlimmster Art geschaffen werde, indem zu der vermehrten Bildung auch noch eine verringerte Zerstörung des Fibrinogens komme.

Allen diesen Theorien über die Entstehung bzw. Zerstörung des Fibrinogens ist durch die zahlreichen Arbeiten von Doyon, Gautier, Kareff, Morel und Nolf der Boden entzogen worden.

Diesen Autoren ist es gelungen, in einwandsfreier Weise den Nachweis zu führen, dass die Entfernung des Darmes entweder keinen Einfluss auf den Fibrinogengehalt hat oder sogar denselben erhöht, und dass auch nach der Darmentfernung einer Defibrination eine Neubildung des Fibrins folgt (37).

Auch die Lehmann'sche Behauptung von der Ungerinnbarkeit des Lebervenenblutes ist widerlegt, denn Nachprüfungen haben ergeben, dass dieses Blut immer gerinnt, zuweilen etwas schneller, zuweilen etwas langsamer als das Carotisblut (38).

Der Fibringehalt des arteriellen Blutes ist unter allen Umständen grösser als derjenige des entsprechenden Venenblutes. Nach Aderlass oder Totaldefibrination zeigt im Stadium der Fibrinregeneration das Lebervenenblut den grössten Fibringehalt (39).

Ferner konnten Doyon und Kareff (40) zeigen, dass, wenn nach Herausnahme der Leber die Circulation durch Verbindung der Pfortader mit einer Lebervene wieder hergestellt wird, das Fibrinogen verschwindet und das Blut ungerinnbar wird.

Nolf (41) bestätigt dieses und stellt ausserdem fest, dass das Lebervenenblut mehr Fibrinogen enthält als das Pfortaderblut.

Die Leber als Fibrinogenbildner.

Haben also die genannten Forscher in ihren Arbeiten einerseits die bis dahin ziemlich allgemein geltenden Anschauungen von dem Fibrinogen in einwandsfreier Weise widerlegen können, so glauben sie andererseits in der Leber das Organ vor sich zu haben, welches die Bildungsstätte dieses Eiweisskörpers darstellt.

In einer grossen Reihe von Versuchen konnten sie den Nachweis erbringen, dass sowohl die Herausnahme der Leber, die Anlegung der Eck'schen Fistel, wie auch die Schädigung der Leberzellen durch die verschiedensten Gifte z. B. Chloroform, Phosphor, hepatotoxisches Serum a. A. m. ein Verschwinden des Fibrinogens und ein Ungerinnbarwerden des Blutes nach sich zieht.

Zweifellos wirken alle diese hier nur sehr kurz angeführten Untersuchungen sehr überzeugend und lassen einen engen Zusammenhang zwischen Leber und Fibrinogen bzw. Fibrin für sehr glaubhaft erscheinen.

Das Knochenmark als Fibrinogenerzeuger.

Im Gegensatz hierzu ist von deutscher Seite dem Knochenmark eine besondere Bedeutung für die Fibrinogenbildung beigelegt worden.

Von P. Th. Müller (42) ist der Nachweis geführt worden, dass nach künstlicher Infection von Thieren mit Typhusbacillen, Streptokokken und namentlich Eiterstaphylokokken ausser einer beträchtlichen Fibrinogenvermehrung im Blute eine solche sich auch im Knochenmark nachweisen lässt. Diese Erscheinung ist nicht durch den Blut- und Lymphgehalt dieses Organes zu erklären, sondern weist vielmehr darauf hin, dass dieser Eiweisskörper im Knochenmark selbst entsteht. Müller äussert die Ansicht, dass ausser dem Knochenmark auch den Lymphdrüsen, der Milz und auch dem reichen lymphoiden Apparat des Verdauungscanals die Fähigkeit der Fibrinogenerzeugung zukomme, während er den im Kreislauf befindlichen Leukocyten diese Kraft abspricht.

Diese Anschauung hat neuerdings eine starke Stütze erhalten durch die Arbeit von Morawitz und Rehn (43).

Diese Autoren zeigten, dass bei Thieren, die man im Stadium der Refibrination tödtet, neben einer starken Leukocytose eine erhebliche myeloide Reaction des Knochenmarkes und myeloide Herde in der Milz sich finden.

Verfährt man so, dass eine Defibrination des entnommenen und nachher wieder injicirten Blutes durch Hirudin verhindert wird, so bleiben diese Veränderungen aus.

Es werden also trotz der ausführlichen Arbeiten der oben genannten französischen Forscher immer wieder Untersuchungen zur Ermittlung der Ursprungsstätte des Fibrinogens angestellt, und dieses ist in verschiedenen Umständen begründet.

Die Schlussfolgerungen, welche Doyon und seine Mitarbeiter aus ihren Versuchen gezogen haben, werden nämlich etwas fraglich durch die Thatsache, dass das Blut von Thieren bei Phosphorvergiftung stark fibrinolytisch wirkt (44, 45, 49), und die Vermuthung lässt sich nicht von der Hand weisen, dass es sich bei der Ungerinnbarkeit des Blutes nach Leberschädigung um einen beschleunigten Abbau des Fibrinogens bezw. Febrins handelt. Der Zusammenhang ist etwa so zu denken, dass die normale Leber ein gegen das fibrinolytische Ferment wirksames Antiferment producirt.

Hierzu möchte ich allerdings bemerken, dass durch weitere Versuche erst die Frage entschieden werden muss, ob bei den vielen anderen Leberschädigungen, die nach Doyon zu einem Fibrinogenschwund führen, das Blut ebenfalls eine stark fibrinolytische Eigenschaft zeigt.

Bedeutungsvoll erscheint mir auch die Thatsache, dass nach Leberschädigung nicht immer das Ungerinnbarwerden des Blutes auf einer Fibrinogenabnahme beruht. Vielmehr findet sich z. B. nach Atropininjection in die Pfortader das erstere ohne das letztere (46).

Schliesslich findet bei der Anschauung jener französischen Autoren ein wesentliches Moment gar keine Berücksichtigung, nämlich das fast constant beobachtete Zusammentreffen von Hyperleukocytose mit Fibrinvermehrung. Dieser Umstand wird ja, wie schon erwähnt, auch von Mathew (34) für seine Theorie ins Feld geführt, und in dieser Hinsicht sind gerade die genannten Versuche von Müller (42), Morawitz und Rehn (43) sehr beachtenswerth.

Pfeiffer (47) führte als erster einwandsfrei den Nachweis, dass bei denjenigen Infectionskrankheiten, die mit einer starken Leukocytose einherzugehen pflegen, auch stets eine erhebliche Fibrinvermehrung zu beobachten ist, und er giebt folgende Mittelwerthe an:

Normal	39,3	mg N-Fibrin	= 2,324	pM. Fibrin
Pneumonie	105,9	" "	= 6,26	" "
Gesichtserysipel	89,0	" "	= 5,26	" "
Ac. Polyarthrit.	127,5	" "	= 7,54	" "
Scarlatina.	85,7	" "	= 7,07	" "
Lungenabscess	83,2	" "	= 4,92	" "
Puerp. Inf. mit para- metr. Exsud. und diff.				
Peritonitis	104,2	" "	= 6,16	" " ¹⁾

Hingegen zeigen Typhus, Malaria, Sepsis ohne locale Eiterung, Nephritis (Urämie) sowohl in Bezug auf Leukocytenzahl wie auch auf Fibrinmenge ein entgegengesetztes Verhalten.

Langstein und Meyer inficirten Kaninchen mit verschiedenen Mikroorganismen und kamen zu dem Ergebniss, dass neben den Streptokokken vor allem die Pneumokokken die Fähigkeit besitzen, eine starke Fibrinvermehrung hervorzurufen.

Die Versuche von Müller (42), welche zeigten, dass eine Infection mit Eiterstaphylokokken ganz im Gegensatz zu Sputumstaphylokokken von einer sehr erheblichen Steigerung der Fibrinogenmenge im Blut und im Knochenmark gefolgt ist, habe ich bereits Erwähnung gethan. Bekanntlich rufen diese Bakterien stets auch eine starke Leukocytose hervor.

In der Hallenser Frauenklinik ist die Beobachtung gemacht worden, dass bei Streptokokkeninfectionen das Blut ausserordentlich leicht gerinnt, und auch Much (48) sagt in einer neueren Arbeit, dass das Blut bei Streptokokken-, Staphylokokken-, Pneumokokken- und Coliinfection eine sehr starke Gerinnungsbeschleunigung erfährt, so dass es meist schon in der Spritze gerinnt.

Aus diesen Versuchen ergibt sich also, dass bei allen Infectionskrankheiten mit stärkerer Hyperleukocytose auch eine beträchtliche Vermehrung der Blutgerinnungsfähigkeit und des entstehenden Fibrins zu beobachten ist.

Ein Vergleich lehrt, dass die hier vorhandenen Fibrinwerthe, die für die Eklampsie von Kollmann (13) gefundenen, ausserordentlich hohe Zahlen erreichen, während sie diejenigen von Dienst (14)

1) Eigene Berechnung. Der Stickstoffgehalt des Fibrins beträgt nach Hammersten 16,91 pCt.

an Höhe bedeutend übertreffen. Diese Thatsache möchte ich mit Nachdruck hervorheben.

Bei Infectionskrankheiten sind nach der Feststellung von Arneth (27) die ein- und zweikernigen Leukocyten stark in der Mehrheit, und auf diesen Unterschied gegenüber der Leukocytose bei der Schwangerschaftsnier- und Eklampsie macht Dienst besonders aufmerksam.

Auf Grund seiner Anschauungen über die Herkunft der fibrinbildenden Substanzen muss er zu dem Schlusse gelangen, dass bei den Infectionskrankheiten diese Körper eine erheblichere Steigerung nicht erfahren. Dieses entspricht aber keineswegs den thatsächlichen Verhältnissen.

Kurz möchte ich noch darauf hinweisen, dass Pfeiffer (10) gezeigt hat, dass bei der Leukämie eine Vermehrung des Fibrinogens trotz der ausserordentlich hohen Leukocytenzahl nicht zu beobachten ist.

Im Gegensatz hierzu hat freilich neuerdings Erben (11) in einem von zwei untersuchten Fällen von myeloider Leukämie eine nicht unbeträchtliche Fibrinvermehrung auf 0,5944 pCt. herausgefunden, während er eine Fibrinsteigerung auch hier nicht beobachtet hat.

Vorläufig wird man wohl an der Ansicht festhalten müssen, dass das Fibrinogen bei der Leukämie keine Zunahme erfährt.

Es will mir scheinen, als ob in dem festgestellten Unterschiede zwischen der Leukocytose bei Leukämie und bei infectiösen — toxischen Erkrankungen nichts Befremdendes zu erblicken ist, worauf auch schon Müller in seiner Arbeit hingewiesen hat, denn es handelt sich doch hierbei um zwei ganz verschiedenartige Vorgänge.

Bei der Leukämie stellt die Leukocytose eine eigentliche Krankheitserscheinung dar, während man in der Leukocytose bei Infectionskrankheiten eine ausgezeichnete Vertheidigungsmaassregel des Organismus gegen den eingedrungenen Feind erblicken muss.

Bedenkt man dieses, so wird man unwillkürlich dem Gedanken zuneigen, dass es sich vielleicht bei der Vermehrung der fibrinbildenden Stoffe auch um eine Selbsthülfe des Körpers handelt.

Diese Ansicht wird besonders auch von Bergell (40) getheilt, auf dessen ausführliche Bearbeitung dieses Gegenstandes ich an dieser Stelle verweisen will.

Herkunft der Thrombokinase.

Bereits Alex. Schmidt stellte den Satz auf, dass die zymoplastischen Substanzen bezw. das Fibrinferment aus den Leukocyten stammen und bei deren extravasculärem Zerfall frei werden.

Diese Anschauung war längere Zeit unbestritten und auch heute kann sie noch nicht als völlig widerlegt angesehen werden. Aber es mehren sich doch die Stimmen, welche sich zum Theil gegen einen Zerfall, zum Theil gegen jegliche Bethheiligung der weissen Blutkörperchen bei der Fibrinfermentbildung wenden.

Es lässt sich heute mit ziemlicher Bestimmtheit sagen, dass ein starker Leukocytenzerfall zur Fibrinfermentbildung nicht erforderlich ist.

Rüchel und Spitta (50) und Bayon (51) haben gezeigt, dass die Leukocytenabnahme bei der Gerinnung im Einzelnen eine sehr wechselnde Höhe erreicht, im Durchschnitt sich aber in recht bescheidenen Grenzen hält. Man kann der Ansicht dieser Autoren wohl zustimmen, dass dieser geringe Leukocytenverlust sich durch den sehr wechselnden Einschluss von weissen Blutkörperchen in das Fibrinnetz erklären lässt.

Rüchel und Spitta weisen auch namentlich darauf hin, dass eine besondere Abnahme der polynucleären Leukocyten nicht zu beobachten ist, sondern dass vor und nach der Gerinnung das relative Verhältniss der einzelnen Leukocytenklassen keine Verschiebung aufweist.

Krüger (52) hat sich mit grosser Schärfe gegen diese Feststellungen gewendet. Aber abgesehen von dem Umstande, dass die Auslegung, welche er den Resultaten der genannten Autoren giebt, kaum richtig sein dürfte, übersieht er die zahlreichen anderen, besonders von französischer Seite über diesen Gegenstand veröffentlichten Untersuchungen, welche alle gegen die von Krüger vertheidigte Ansicht sprechen.

Dastre (53) und Arthus (54) führen in ihren Arbeiten aus, dass die Fibrinfermententstehung weder an einen Zerfall noch an eine Degeneration der weissen Blutkörperchen geknüpft ist, und sie glauben, dass es sich hier um einen secretorischen Vorgang handelt.

Gegen eine Bethheiligung der polynucleären Leukocyten bei der Blutgerinnung wendet sich neben Dastre besonders auch Stassano,

welcher die Bedeutung der Mononucleären ganz in den Vordergrund schiebt.

Im Gegensatz zu diesen französischen Forschern, die eine Bedeutung der Leukocyten für die Blutgerinnung keineswegs leugnen, sprechen sich andere namhafte Autoren, ich nenne nur Bürker, mit Entschiedenheit gegen jegliche Betheiligung der Leukocyten aus und sind der Ansicht, dass nur die Blutplättchen bei der Gerinnung eine Rolle spielen.

Es kann als erwiesen gelten, dass der Blutgerinnung bzw. Thrombosenbildung eine ausgiebige Agglutination von Blutplättchen vorausgeht, und dass bei der Gerinnung selber dieselben massenhaft zerfallen.

Bürker (56) stellt auf Grund seiner Untersuchungen eine directe Beziehung zwischen Beeinflussung von Blutplättchen und Blutgerinnung fest, während er eine Aenderung im Zustande der anderen Blutelemente für völlig irrelevant hält.

Gegen diese Auffassung ist von verschiedenen Seiten geltend gemacht worden, dass Flüssigkeiten, welche keine Blutplättchen enthalten, wie Gansblut, Lymphe und von Blutplättchen befreites Säugethierblut spontan, allerdings sehr langsam gerinnen.

Dieser Einwand erscheint mir wenig zwingend. Die Leukocyten und ebenso auch die rothen Blutkörperchen enthalten, wie überhaupt jede Zelle, thrombokinatiseh wirkende Substanzen. Eine nur leukocytenhaltige Flüssigkeit muss daher, vorausgesetzt, dass alle sonstigen zur Fibrinbildung nöthigen Substanzen in ihr vorhanden sind, auch der Gerinnung anheimfallen. Dieser Vorgang wird jedenfalls durch Zusatz von Thrombokinasen stark beschleunigt.

Manches wird noch für, Manches gegen die Betheiligung der Leukocyten bei der Fibrinfermentbildung angeführt. Man kann heute noch kein abschliessendes Urtheil darüber geben, ob die von Bürker aufgestellte Theorie sich wird im ganzen Umfange aufrecht erhalten lassen. Jedenfalls spricht Vieles dafür. Ziemlich allgemein vertritt man jetzt bereits den Standpunkt, dass den Blutplättchen zum Mindesten die wichtigste Rolle bei dem Gerinnungsvorgange zukommt, und die alte Schmidt'sche Lehre verliert mehr und mehr an Boden.

Ich habe bereits soeben der schon lange bekannten, besonders von Rauschenbach (57) festgestellten Thatsache Erwähnung gethan, dass alle Zellen gerinnungserregende bzw. -befördernde Stoffe

enthalten, und dass die Thrombokinese ein ganz allgemeines Protoplasmaprodukt ist.

Sehr interessant erscheint mir in dieser Hinsicht die von Much (48) in seiner oben erwähnten Arbeit gemachte Mittheilung, dass bei Einsaat von *Staphylococcus aureus* in menschliches Blutplasma nach kurzer Zeit eine Gerinnung eintritt. Much ist geneigt, in diesem Mikroorganismus eine der Thrombokinese gleichwirkende Staphylokinase anzunehmen.

Ich erachte es für wichtig, auf diesen Punkt der allgemeinen Verbreitung thrombokinetischer Substanzen einzugehen.

Einzelne Autoren sehen neuerdings in dem Uebergang von Fibrinferment aus der Placenta in das mütterliche Blut ein wesentliches ätiologisches Moment für das Zustandekommen der Eklampsie.

Diese Anschauung stützt sich namentlich auf die festgestellte Thatsache, dass Placentarpresssaft bei Thieren, intravenös injicirt, tödtlich wirkt, und dass die Section in diesen Fällen eine sehr ausgedehnte Thrombosenbildung ergibt.

Diese Arbeiten stellen nur eine Ergänzung zu der längst bekannten Thatsache dar, dass Gewebsextrakte, intravenös injicirt, stark gerinnungsanregend wirken.

In neuerer Zeit haben sich besonders Conradi (58), Boggs (59) und Mioni (60) mit diesem Gegenstande beschäftigt. Sie haben fast alle Organe nach dieser Hinsicht ausführlich untersucht und sind zu dem Ergebniss gelangt, dass namentlich den kernreichen Organen wie Pankreas, Thymus, Lymphdrüsen eine stark gerinnungserregende Kraft innewohnt, welche aber auch Leber, Niere, Milz u. s. w. in mehr oder weniger ausgedehntem Maasse besitzen, was auch von Freund (61) bestätigt wird.

Nach alledem kann es nur natürlich erscheinen, dass auch der Saft aus der Placenta mit ihrem grossen Kernreichthum bei intravenöser Injection eine starke Thrombosirung hervorruft.

Ich beabsichtige nicht, an dieser Stelle auf die sehr verschiedenen Ansichten einzugehen, welche über die Natur der in den Gewebssäften vorhandenen gerinnungserregenden Substanzen bestehen. Die Erforschung dieser ebenso interessanten wie schwierigen Frage ist noch weit entfernt von einem einheitlichen Resultat.

Hinweisen möchte ich aber auf den Unterschied, welcher in der Wirkung intravenöser Injection von Gewebssaft und Fibrinferment zu constatiren ist.

Bereits Naunyn (62) und Jakowicky (63) konnten darthun,

dass Injectionen von Fibrinferment keine intravasculären Gerinnungen hervorrufen. Diese älteren Ergebnisse sind neuerdings von Mioni (60) und Boggs (59) vollauf bestätigt worden. Letzterer zeigte, dass 40 cem von activirtem Serum, welches auf Fibrinogenlösung stark wirkte, beim Kaninchen intravenös injicirt gar keinen Einfluss auf die Gerinnung ausübt.

Hiernach muss es zum Mindesten sehr fraglich erscheinen, ob es berechtigt ist, die Gewebssaftwirkung mit der Wirkung von Fibrinferment bezw. deren Vorstufe zu identificiren. Vielmehr scheint es sich hier um sehr complicirte Verhältnisse zu handeln. Die Anwesenheit von Fibrinogen und Fibrinferment im Blute ist noch keineswegs immer gleichbedeutend mit einer eintretenden Gerinnung, sondern es spielen dabei die verschiedenartigen gerinnungsauslösenden bezw. gerinnungsverhindernden Momente eine bedeutungsvolle Rolle.

Unsere Kenntniss aller dieser Dinge ist noch sehr gering und daher ist äusserste Vorsicht bei ihrer Bewerthung erforderlich, zumal wenn es sich um pathologische Zustände handelt.

Zusammenfassung.

Zum Schluss möchte ich die wichtigsten Ergebnisse meiner Untersuchungen und meiner theoretischen Betrachtungen kurz zusammenstellen.

Der Gesamteiweissgehalt ist bei Schwangeren und Kreissenden etwas geringer als bei Nichtschwangeren, bei den Neugeborenen niedriger als bei den Müttern.

Der Fibringehalt ist bei Schwangeren etwas höher als bei nichtschwangeren Frauen, bei Kreissenden noch höher als bei Schwangeren, bei Neugeborenen selbst niedriger als bei Nichtschwangeren.

Eine Steigerung der Fibrinogenmenge bei Eklamptischen gegenüber normalen Kreissenden ist nicht nachweisbar.

Bei dem untersuchten Fall von Schwangerschaftsniere ist der Fibrinogengehalt nicht vermehrt. Hingegen zeigt die Reststickstoffmenge eine sehr starke Erhöhung.

Die im Kreislauf befindlichen Leukocyten haben mit der Fibrinogenbildung nichts zu thun. Als Entstehungsort für das Fibrinogen kommen in Betracht einerseits die Leber, andererseits die lymphoiden Organe, und zwar besonders das Knochenmark.

Eine stärkere Betheiligung der Leukocyten bei der Fibrinfermentbildung ist äusserst zweifelhaft. Jedenfalls kann die Be-

hauptung als widerlegt angesehen werden, dass zur Fibrinfermentbildung ein stärkerer Zerfall von Leukocyten, vornehmlich der polynucleären, erforderlich ist.

Im Gegensatz hierzu gewinnt die Ansicht, dass die Blutplättchen für die Gerinnung von grösster Bedeutung sind, immer mehr an Boden.

Gegen eine vornehmliche Beteiligung der vielkernigen polynucleären Leukocyten sprechen die Verhältnisse bei den Infectiouskrankheiten. Obwohl diese Blutelemente hier in starker Minderheit sind, hat sich eine sehr beträchtliche Steigerung der Blutgerinnungsfähigkeit und der entstehenden Fibrinmenge herausgestellt.

Nach Allem komme ich zu dem Ergebniss, dass die Leukocyten als ätiologisches Moment für die Schwangerschaftsnier- und Eklampsie im Sinne von Dienst nicht in Betracht kommen.

Auch glaube ich nicht, dass es berechtigt ist, aus der thrombosenerzeugenden Wirkung von Placentarsaftinjection den Schluss zu ziehen, dass das Fibrinferment den wesentlichen Factor bei der Entstehung der Eklampsie darstellt.

L i t e r a t u r.

1. J. Veit, Untersuchungen über den osmotischen Druck zwischen Mutter und Kind. Zeitschr. f. Geburtshülfe. 1900. Bd. 42. S. 316.
2. Heymann, Folia haematologica. 1906. Bd. 3. S. 7 u. 71.
3. Zangemeister, Die Beschaffenheit des Blutes in der Schwangerschaft u. d. Geburt. Zeitschr. f. Geburtshülfe. 1903. Bd. 49. S. 92.
4. Zangemeister und Meissl, Vergl. Untersuchungen über mütterl. und kindl. Blut. Münch. med. Wochenschr. 1903. S. 673.
5. Lewinski, Beobachtungen über den Gehalt des Blutplasmas an Serum-Albumin-Globulin und Fibrinogen. Pflüger's Arch. 1903. Bd. 100. S. 601.
6. Scipiadès und Farkas, Ueber die moleculare Concentration des Blutserums. Heger's Beitr. 1905. Bd. 9. S. 84.
7. Raineri, Archivio di Ostetrica e Gynecologia Napoli 1903. Im Ref. Fol. haemat. 1907. Bd. 4. S. 213.
8. Bauereisen, Die Beziehungen zwischen dem Eiweiss der Frauenmilch u. d. Serumeiweiss von Mutter u. Kind. Dieses Arch. 1910. Bd. 90. S. 349.
9. Langstein und Meyer, Ueber das Verhalten der Eiweisskörper d. Blutplasmas bei exper. Infection. Hofmeister's Beitr. 1904. Bd. 5. S. 69.
10. Pfeiffer, Ueber den Fibringehalt d. leukäm. Blutes. Centralbl. f. innere Med. 1904. S. 809.
11. Erben, Die chem. Zusammensetzung d. leuk. Blutes. Zeitschr. für klin. Med. 1908. Bd. 66. S. 278.

12. Nasse, Das Blut von Schwangeren. Dieses Arch. 1876. Bd. 10. S. 315.
13. Kollmann, Zur Aetiologie u. Therapie d. Eklampsie. Centralbl. f. Gyn. 1897. Bd. 2. S. 341.
14. Dienst, Krit. Studien über d. Pathogenese d. Eklampsie. Dieses Arch. 1902. Bd. 65. S. 369.
15. Arthus et Pagès, Nouvelle théorie chimique de la coagulation du sang. Arch. de Phys. 1890. 5. Série. 2. Bd. S. 739.
16. Hammersten, Ueber d. Bedeutung d. lösl. Kalksalze für d. Faserstoffgerinnung. Zeitschr. f. physiol. Chemie. 1896/97. Bd. 22. S. 333.
17. Reye, Ueber Nachweis und Bestimmung des Fibrinogens. Inaug.-Diss. Strassburg 1898.
18. Denis, Nouv. études chim. physiol. et médic. sur les substances albuminoïdes. Paris 1856. (Cit. in Virchow's Jahresbericht.)
19. Heubner, Die Spaltung des Fibrinogens bei der Fibringerinnung. Arch. f. Path. u. Pharm. 1903. Bd. 49. S. 229.
20. Huiscamp, Zur Globulinfrage. Zeitschr. f. physiol. Chem. 1905. Bd. 44. S. 182.
21. Kauder, Zur Kenntniss der Eiweisskörper des Blutserums. Arch. f. Path. und Pharm. 1886. Bd. 20. S. 411.
22. Hammersten, Lehrb. d. physiol. Chemie. 1910.
23. Hoppe-Seyler-Thierfelder, Handb. d. physiolog. u. patholog. chem. Analyse. 1909. a) S. 560—62, b) S. 393.
24. Schmorl, 1) Pathol.-anat. Unters. über Eklampsie. Leipzig 1893. 2) Zur pathol. Anat. d. Eklampsie. Verh. in d. Ges. f. Gyn. Giessen 1901.
25. Lubarsch, Ueber d. pathol. Anat. u. Pathogenese d. Eklampsie. Corresp.-Bl. d. allg. meckl. Aerztereins.
26. Dienst, Die ätiol. Bedeut. d. weissen Blutkörper. f. d. Schwangerschaftsniere u. Eklampsie. Dieses Arch. 1910. Bd. 90. S. 536.
27. Arneth, 1) Die neutrophilen Leukocyten etc. Jena 1904. Vergl. Hiller, Folia Haem. Bd. 2. S. 85. — 2) Die Leukocyten in der Schwangersch. etc. Dieses Arch. Bd. 74. S. 143.
28. Alex. Schmidt, 1) Die Lehre von den fermentativen Gerinnungserscheinungen. Dorpat 1876. — 2) Zur Blutlehre. Leipzig 1892. (Beides cit. nach Virch. Jahresber.)
29. Hammersten, Ueber d. Faserstoff u. seine Entstehung aus d. Fibrinogen. Pflüger's Arch. 1883. Bd. 30. S. 437.
30. Morawitz, 1) Beitr. z. Kenntn. d. Blutgerinnung. Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1904. Bd. 79. S. 1. — 2) Chem. d. Blutgerinnung. Erg. d. Phys. 1905. Bd. 4. S. 307. — 3) Die Blutgerinnung. Handb. der Biochemie von Oppenheimer. 1909. Bd. II. 2. S. 52.
31. Fuld und Spiro, Der Einfluss gerinnungshemmender Agentien. Hofmeister's Beitr. 1904. Bd. 5. S. 171.
32. Joh. Müller, Beob. z. Analyse d. Lymphe, d. Blutes u. d. Chylus. Poggen-dorf's Annalen. Bd. 25. 1832. S. 537.
33. Dastre, Évolution du fibrinogène dans le sang. Arch. de Phys. 1894. Bd. 25. (Hier auch ältere Literatur.)
34. Mathew, The origine of Fibrinogen. Americ. Journ. of Phys. 1899. Bd. 3. S. 53.

35. Corin und Ansiaux, Unters. üb. Phosphorvergiftung. Vierteljahrsschr. für gerichtl. Med. 1894. 3. Folge. Bd. 7. (Cit. nach Virch. Jahresber.)
36. Lehmann, Jahresb. für practische Chemie. 1851. (Cit. nach Cannstadt's Jahresb. 1855.)
37. Doyon et Gautier, Sur le rôle de l'intestin dans la fibrinogenèse. Journ. de Phys. et de Pathol. génér. 1907. Bd. 90. S. 405.
38. Doyon, Gautier et Kareff, Recherches sur la coagulabilité du sang des veines sus-hépatiques. Ebendasselbst. 1906. Bd. 8. S. 1003.
39. Doyon, Morel et Kareff, Teneur comparée du sang en fibrine dans différentes territoires vasculaires. Ebendasselbst. S. 783.
40. Doyon et Kareff, Modifications de la coagulabilité du sang consécutives à la destruction du foie. Ebendasselbst. 1905. Bd. 7. S. 639.
41. Nolf, Les modifications de la coagulation du sang chez le chien après l'exstirpation du foie. Arch. int. d. Phys. 1905. Bd. 3.
42. P. Th. Müller, Ueber chem. Veränd. d. Knochenmarks nach intraperitonealer Bacterieneinspritzung. Hofmeister's Beitr. 1905. Bd. 6. S. 454, u. Phys. Centralbl. 1906.
43. Morawitz u. Rehn, Zur Kenntniss d. Entstehung d. Fibrinogens. Arch. f. Pathol. u. Pharm. 1908. Bd. 58. S. 141.
44. Jakoby, Ueber d. Bezieh. d. Leber- u. Blutveränderungen zur Autolyse. Zeitschrift f. physiol. Chemie. 1900. Bd. 30. S. 174.
45. Loeb, Einige neuere Arb. über d. Blutgerinnung bei Wirbellosen und Wirbelthieren. Bioch. Centralbl. 1907. Bd. 6. S. 829—884.
46. Doyon et Kareff, Action de l'atropine sur la coagulation du sang. Journ. d. Phys. et de Pathol. gén. 1906. Bd. 18.
47. Pfeiffer, Ueber den Fibringehalt d. menschl. Blutes. Zeitschr. f. klin. Med. 1897. Bd. 33. S. 215.
48. Much, Ueber eine Vorstufe d. Fibrinfermentes in Culturen von Staphylococcus aureus. Bioch. Zeitschr. 1908. Bd. 14. S. 143.
49. Bergell, Ueber die Wirkung des Fibrins. Deutsche med. Wochenschrift. 1908. No. 9 u. 1909. S. 663.
50. Rüchel u. Spitta, Einige Beob. über Blutgerinnung und Leukocyten. Arch. f. Pathol. u. Pharm. 1904. Bd. 49. S. 285.
51. Bayon, Leukocyten und Blutgerinnung. Bioch. Zeitschr. 1904. Bd. 45. S. 104.
52. Krüger, Leukocyten und Blutgerinnung. Arch. f. Pathol. u. Pharmak. 1904. Bd. 51. S. 325.
53. Dastre, Sur les causes initiales de la coagulation etc. Compt. rend. de la Soc. de Biol. 1903. Bd. 55.
54. Arthus, Sur la genèse du fibrinferment. Ebendort. Beides cit. n. Journ. de Phys. et de Path. gén. 1904. Bd. 6.
55. Stassano, Rôle des diverses espèces de leucocytes dans la coagulation du sang. Ebendasselbst.
56. Bürker, Blutplättchen und Blutgerinnung. Pflüger's Archiv. 1903/04. Bd. 102. S. 36.
57. Rauschenbach, Ueber die Wechselwirkungen zwischen Protoplasma und Blutplasma. In.-Diss. Dorpat 1883.

58. Conradi, Ueber die Beziehungen der Autolyse zur Blutgerinnung. Hofmeister's Beitr. 1902/03. Bd. 1. S. 136.
 59. Boggs, Ueber Beeinflussung der Gerinnungszeit im lebenden Organismus. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1904. Bd. 79. S. 539.
 60. Mioni, Contributions à l'étude des transf. sang. Arch. int. de Phys. 1904/05. Bd. 3.
 61. Freund, Zur placentar. Eklampsie-Aetiologie. Berliner klin. Wochenschr. 1909. No. 15.
 62. Naunyn, Untersuchungen über Blutgerinnung im lebenden Thiere. Arch. f. Pathol. u. Pharm. 1873. Bd. 1. S. 1.
 63. Jakowicky, Zur physiologischen Wirkung der Bluttransfusion. In.-Diss. Dorpat 1875.
-

Lebenslauf.

Am 4. September 1885 bin ich, Erich Landsberg, als Sohn des Kaufmanns Julius Landsberg in Berlin geboren. Nach dem frühen Ableben meiner Eltern kam ich in das Haus meines Onkels, des Regierungs- und Baurats Hermann Landsberg zur Zeit in Halle a. S.

Ich besuchte die Oberrealschulen zu Berlin und Danzig und erlangte dort am 15. März 1906 das Zeugnis der Reife. Ich studierte die beiden ersten Semester in Königsberg, die übrige Zeit in Halle. Am 21. September 1907 legte ich am Realgymnasium zu Eilenburg die erforderliche Nachprüfung in der lateinischen Sprache ab. Am 8. August 1908 bestand ich die ärztliche Vorprüfung, am 31. Mai 1911 die ärztliche Prüfung, am 28. Juli 1911 die Fakultätsprüfung.

Meine Lehrer waren die Dozenten:

in Königsberg:

Klinger, Luerssen, Schmidt, Stieda, Zander;

in Halle:

Anton, Bernstein, v. Bramann, Dorn, Fränken, Frese, Fromme, Freund, Gebhardt, Grenacher, Eisler, Eberth, Haasler, Harnack, v. Hippel, Heynemann, Hoffmann, Mohr, Roux, Schmidt, Schmidt-Rimpler, Schulz, Stieda, Schwartze, Stöltzner, Veit, Volhardt, Wullstein.

In meinem praktischen Jahre war ich 4 Monate an der Medizinischen Klinik, die übrige Zeit an der Frauenklinik zu Halle a. S. tätig.

Ich möchte an dieser Stelle allen meinen Lehrern herzlichen Dank aussprechen, besonders Herrn Geheimrat Veit für die Anregung zu dieser Arbeit und des gütigst überlassenen zahlreichen Material und Herrn Privatdozent Dr. Heynemann für die jederzeit bereitwilligst gewährte Unterstützung.
